



**Kammolch und Gelbbauchunke | Vögel in europäischen  
Vogelschutzgebieten**

Diese Beiträge erscheinen im Rahmen des ANLiegen Natur-Sonderheftes "25 Jahre Natura 2000"

[Kurzartikel]

Günter Hansbauer und Ralf Schreiber

Kammolch und Gelbbauchunke - die FFH-Flaggschiffe unter den Amphibien  
Kammolch und Gelbbauchunke sind die einzigen Amphibien, die in Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) geführt sind. Beide Arten sind stark gefährdet und gehen flächendeckend zurück. Die Umsetzung der FFH-Richtlinie bietet die Chance, die Amphibienbestände zu erhalten und so zu fördern, dass sie langfristig überleben.

Mehr:

[http://www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/meldungen/wordpress/amphibien\\_natura\\_2000/](http://www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/meldungen/wordpress/amphibien_natura_2000/).

---

[Kurzartikel]

Günter von Lossow

Vögel in europäischen Vogelschutzgebieten

Die Europäische Vogelschutzrichtlinie und die Europäischen Vogelschutzgebiete sind ein wichtiger Baustein zum Schutz der Vogelwelt Bayerns. Sie gehören als Hotspots der wildlebenden Vogelarten in Europa dem zusammenhängenden Netz Natura 2000 an. Im vorliegenden Beitrag wird die Rolle der Europäischen Vogelschutzgebiete beim Schutz von drei Brutvogelarten exemplarisch beleuchtet: Weißstorch, Wiesenweihe und Großer Brachvogel.

Mehr:

<http://www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/meldungen/wordpress/voegel/>.

---

Paul-Bastian Nagel Bayerische Akademie für Naturschutz und  
Landschaftspflege (ANL) Fachbereich 2 - Landschaftsentwicklung und  
Umweltplanung Seethalerstraße 6 83410 Laufen Telefon: +49 8682 8963-47  
Telefax: +49 8682 8963-17 paul-bastian.nagel@anl.bayern.de  
[www.anl.bayern.de](http://www.anl.bayern.de)